

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO NEL LATTANTE (<1 ANNO)

1. Il lattante è cosciente e si ostruisce: non respira, non piange, non riesce a tossire. (Ostruzione completa)

2. CHIEDI aiuto e allerta il 118.

Quindi: afferrando la mandibola, posizionalo prono in maniera stabile sulla coscia, con il capo maggiormente declive rispetto al corpo.

3. ESEGUI: 5 vigorosi colpi interscapolari con via di fuga laterale per non colpire la testa.

Rigira il lattante con cautela con il capo declive ed

4. ESEGUI: 5 compressioni toraciche lente e profonde al centro dello sterno (metà inferiore dello sterno, un dito sopra il processo xifoideo).

Continua ad alternare le manovre fino all'espulsione del corpo estraneo.

Se queste manovre non sono efficaci ed il lattante diventa incosciente.

5. Chiama il 118.

Posiziona il lattante su un piano rigido.

Apri le vie aeree con una posizione neutra.





Se il corpo estraneo è affiorante rimuovilo.

Quindi esegui 5 insufflazioni di soccorso Bocca/ Bocca-Naso.

Inizia le manovre di Rianimazione Cardiopolmonare.

Dopo il primo minuto se ancora non attivato.

Attiva il 118.





1

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO NEL BAMBINO (>1 ANNO)

1. Il bambino è cosciente e si ostruisce: non respira, non piange, non riesce a tossire.
(Ostruzione completa)

2. CHIEDI aiuto e allerta il 118.



2

Quindi: afferrando la mandibola, posizionalo con il capo in posizione maggiormente declive rispetto al corpo.

3. ESEGUI: 5 vigorosi colpi interscapolari con via di fuga laterale per non colpire la testa.

Rigira il lattante con cautela con il capo declive ed



3

4. ESEGUI: 5 compressioni addominali (manovra di Heimlich). Posizionandoci alle spalle del bambino e circondandone il busto con le braccia, applichiamo con il pugno (posizionato tra l'ombelico ed il processo xifoideo) le compressioni con direzione dal basso verso l'alto.

Continua ad alternare le manovre fino all'espulsione del corpo estraneo.



4

Se queste manovre non sono efficaci ed il bambino diventa incosciente.

5. chiama il 118

Posiziona il bambino su un piano rigido.

Apri le vie aeree con una modica estensione.

Se il corpo estraneo è affiorante rimuovilo.

Quindi esegui 5 insufflazioni di soccorso Bocca/Bocca.

Inizia le manovre di Rianimazione Cardiopolmonare.

Dopo il primo minuto se ancora non attivato.

Attiva il 118.



5