

TERAPIA PER ASMA

Si consiglia di seguire le misure di profilassi ambientale anti-acaro comprensive di coprimaterasso e copricuscino antipollini, lavaggi nasali quotidiani.

FLIXOTIDE 50 o FLUSPIRAL 50: 1 puff mattina e sera per 15 giorni, successivamente 1 volta al giorno per 1/2 mesi in base alla stagionalità come terapia di fondo.

IN CASO DI RICADUTA (tosse insistente rinite insistente con tosse) O DI SINTOMI PREMONITORI (starnuti, naso che cola, tosse, sibilo)
per bambini < di 2 anni BREVA O BRONCOVALIEAS; 2 puff 2 volte al giorno per 7 giorni
per bambini > di 2 anni BREVA O BRONCOVALEAS ; 3 puff 2 volte al giorno per 7 giorni

L'intervallo tra le somministrazioni va **allungato** e variato seguendo l'impegno respiratorio del bambino senza orari fissi.

IN CASO DI ATTACCO ACUTO

iniziare subito il trattamento con: 2 puff di broncodilatatore (ventolin, broncovalieas, breva) se il bambino è < di 2 anni e 3puff se il bambino è > di 2 anni ogni 20 minuti per la prima ora.

-SE LE CONDIZIONI SONO MIGLIORATE allungare progressivamente l'intervallo tra le somministrazioni(prima ogni 1-2 ore successivamente ogni 4-6b ore) in caso copntinueate a somministrare il broncodilatatore per almeno 7 giorni anche se il bambino stà bene.

-SE LE CONDIZIONI NON SONO MIGLIORATE somministrate anche il cortisonico: BENTELAN 0,5MG (1 compressa x 2 volte al giorno per 2-3 giorni) continuare a somministrare il broncodilatatore in base alle condizioni del bambino. Di solito è sufficiente somministrare il cortisonico per 2-3 giorni. Il farmaco può essere interrotto senza scalare la dose.

PRIMA SI FA IL BRONCODILATATORE E POI IL CORTISONE

VA RICHIESTO L'AIUTO DEL MEDICO (ANCHE ANDANDO ALL'OSPEDALE SE:

- si devono fare 3 puff di broncodilatatore a intervalli inferiori alle 3 ore anche dopo avere seguito la terapia dei 32/3 puff ogni 20 minuti

- il bambino fa fatica a parlare
- il bambino è particolarmente agitato e angosciato.